

Paroxetine[®] 20 mg



Merck Generics (UK) Ltd.

| Индикација | Почетна доза (мг) | Препорачана дневна доза (мг) | Максимална дневна доза (мг) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Депресија | 20 мг | 20 мг | 50 мг |
| Панично пореметување | 10 мг | 40 мг | 60 мг |
| Опсесивно-компулсивно пореметување | 20 мг | 40 мг | 60 мг |
| Социјална фобија | 20 мг | 20 мг | 50 мг |
| Генерализирано анксиозно пореметување | 20 мг | 20 мг | 50 мг |
| Пост-трауматско стресно пореметување | 20 мг | 20 мг | 50 мг |

Paroxetine® 20 mg
(скратено упатство)

Состав: Една таблета содржи 20 мг пароксетин.

Индикации: Сите типови депресији, вклучувајќи ги и реактивните и тешките депресији, опсесивно-компулсивни пореметувања и спречување на нивни рецидиви, панични пореметувања со или без агорафобија и превенција на рецидиви на панични пореметувања, социјална фобија, генерално анксиозно пореметување, посттрауматски стрес синдром.

Контраиндикации: Алергија на пароксетин и на останатите компоненти на препаратот, истовремена примена на неселективни ирверзибилни МАО инхибитори.

Мерки на претпазливост: Потребно е да се обрати внимание на историјата на конвулзиите, активацијата на манијата/хипоманијата, суицидалната анамнеза, хиповолемијата или примената на диуретици кај постари лица што ја предиспонира хипонатремијата, на отежнатата агрегација на тромбоцити и на други медицински состојби и заболувања кои што можат да го реметат метаболизмот и хемодинамските функции.

Примена на пароксетин не се препорачува кај деца и адолесценти до 18 годишна возраст затоа што ефикасноста и сигурноста на лекот се уште е во фаза на испитување.

Несакани дејства: Најчести несакани ефекти се чувство или состојба на болест што се редуцира со земање на таблетите со храна, констипација или дијареа, ингестија, губење на апетит, предизвикување на гушење и губиток на тежина.

Несаканите ефекти при земање на Пароксетин обично прекинуваат после првите неколку недели од третманот.

Пакување: Paroxetine® 20 mg, 30 филм-обложени таблети

За дополнителни инаформации обратете се во Варус застапништво Merck.

Merck Generics (UK) Ltd
Station Crosse, Potters Bar
Hertfordshire, Велика Британија

Варус
"Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, Скопје
тел. (02) 3115-122; 3161-806; факс 3137-013
e-mail: varus@mt.net.mk